



USO AGRÍCOLA

herbicida solución concentrada acuosa
2, 4-D Amina 48

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
2, 4-D: Sal dimetilamina del ácido 2, 4-diclorofenoxiacético (Con un contenido de ácido 2, 4-D no menor de 83.06% a 20°C) (Equivalente a 480 g de i.a./kg a 20°C)	49.90%
INGREDIENTES INERTES: Agente neutralizante y agua. No mas de	50.10%
TOTAL:	100.00%

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES
Maíz	Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>)	1.5-2.0	Realizar una aplicación dirigida a la maleza en post-emergencia al cultivo
Sorgo	Verdolaga (<i>Portulaca oleraceae</i>)	1.0-2.0	
(SL)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>)		
	Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)		
	Escoba (<i>Sida acuta</i>)		

Condor

Es un herbicida hormonal selectivo que se emplea en post-emergencia del cultivo y de la maleza para el control de hoja ancha en los siguientes cultivos. maíz, sorgo (sl).



Registro: RSC0-HEDE-0222-0308-014-49.90





USO AGRÍCOLA

herbicida solución concentrada acuosa
2, 4-D Amina 48

¿Qué es?

Herbicida hormonal selectivo a base de sal dimetilamina del ácido 2,4-d amina presentado en fórmula de solución concentrada

¿Para que sirve?

Control post emergente de malezas de hoja ancha de cultivos de maíz, sorgo, trigo, cebada y caña de azúcar

¿Cómo funciona ?

Actúa como una hormona de crecimiento provocando crecimientos násticos descontrolados en las plantas susceptibles, causando agotamiento y muerte

