




USO AGRÍCOLA

herbicida solución acuosa
glifosato

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
SAL ISOPROPILAMINA DE GLIFOSATO: 2-(fosfonometilamino) acetato (Equivalente a 480 g de sal isopropilamina de glifosato /L a 20°C con un contenido de 356 g de i.a. ácido glifosato /L a 20°C)	41.00%
INGREDIENTES INERTES: Surfactante y agua	59.00%
TOTAL:	100.00%

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES
Aguacatero (S/L)	Flor amarilla (<i>Pteridium aquilinum</i>)	2.0-6.0	Realizar una aplicación dirigida a la maleza.
Limón (1)	Escobilla (<i>Sida rhombifolia</i>)		
Naranja (1)	Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>)		
Toronjo (1)	Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)		
Pomelo (1)	Rama de sapo (<i>Talinum paniculatum</i>)		
Plátano (30)	Agrito (<i>Oxalis articulata</i>)		
	Zacate johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	4.0	
	Zacate guinea (<i>Panicum maximum</i>)		
	Zacate bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)		
	Coquillo (<i>Cyperus esculentus</i> , <i>C. rotundus</i>)		
	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)		
	Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>)		
	Hierba de pollo (<i>Commelina erecta</i>)		


Hellcat 360

Es un herbicida sistémico no selectivo para aplicación en post-emergencia de maleza anual y perenne. Es un producto no residual, por lo que no afecta a cultivos posteriores



Registro: RSCO-HEDE-0230-0657-315-41





USO AGRÍCOLA

herbicida solución acuosa
glifosato

¿Qué es?

Herbicida sistémico no selectivo, presentado en forma de concentrado soluble

¿Para que sirve?

Control post-emergente de malezas anuales y perennes

¿Cómo funciona ?

Se absorbe por las hojas. Las malezas detienen su crecimiento a las pocas horas de la aplicación, tardan de 8 a 12 días en volverse amarillas. Debe de ser aplicado sobre la maleza joven en crecimiento activo, es absorbido por el follaje y se trasloca por toda la planta hasta raíces y estolones

Glifosato

Herbicida no selectivo, de amplio espectro para el control post-emergente de malezas anuales y perennes. Posee acción sistémica, se absorbe por hojas y tallos verdes y se trasloca hacia raíces por xilema y floema. El efecto de control es rápido, viéndose los primeros síntomas de amarilleo y marchitamiento hasta 5 días después de realizada la aplicación

