



USO AGRÍCOLA

insecticida concentrado emulsionable
Ametrina 1.8

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO

ABAMECTINA: Mezcla de Avermectina B1a y Avermectina B1b (conteniendo no menos de 80% de Avermectina B1a y no más de 20% de Avermectina B1b) (Equivalente a 18 g de i.a./L a 20 °C)

INGREDIENTES INERTES:

Surfactante, emulsificante, antioxidante, solvente, impurezas y compuestos relacionados.

TOTAL: 100.00%

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*
Apio ¹	Araña roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	1.25	7
Aguacate ²	Araña roja (<i>Oligonychus perseae</i>)	50-150 ml/100 L de agua	14
	Araña roja del aguacatero (<i>Oligonychus punicae</i>)	0.50 - 1.0	
Algodón ²	Araña roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.)	0.50-1.2	20
Berenjena ²	Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>) Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.50-1.25	3
Calabaza ²	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sativae</i>)	0.50-1.0	7
Calabacita ²	Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>)	0.50-1.25	7
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sativae</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.)	0.50-1.0	
Clavel ²	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.) Araña roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus urticae</i>) Araña ciclamina (<i>Steneotarsonemus pallidus</i>)	25-50 ml/10 L de Agua	SL
Crisantemo ²	Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>)	500-1000 ml/ha	SL
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	100 ml/100 L de agua	
	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>) Araña ciclamina (<i>Steneotarsonemus pallidus</i>) Araña roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	25-50 ml/10 L de agua	
	Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>)	0.50-1.25	
Chile ²	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>Liriomyza</i> sp.)	0.50-1.0	3
	Piojillo de la papa (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.75-1.0	
	Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.30-1.0	
Chile Bell ²	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.) Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.30-1.0	3
Fresa ²	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.50-1.25	14
Gerbera ²	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.) Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>) Araña roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) Araña ciclamina (<i>Steneotarsonemus pallidus</i>)	25-50 ml/10 L de agua	SL
Tomate de cáscara ²	Araña de dos Manchas (<i>Tetranychus urticae</i>) Minador serpentina del Chile (<i>Liriomyza munda</i>)	0.50-1.25	3
Toronjo ²	Arador o negrilla de la naranja (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	0.50-1.5	7

Jitomate ²	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sativae</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>) Gusano alfiler del tomate (<i>Keyferia lycopersicella</i>) Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.50-1.0	10
	Piojillo de la papa (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.50-0.75	
	Araña roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	0.30-1.2	
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.) Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.30-1.0	
	Minador serpentina del Chile (<i>Liriomyza munda</i>)	1.0-1.5	
Lima ³	Araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>) Arador o negrilla de la naranja (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	0.50-1.5	7
Limonero ³	Arador o negrilla de la naranja (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	0.50-1.5	7
Mandarino ³	Araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>) Arador o negrilla de la naranja (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	0.50-1.5	7
Manzano ²	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.50-1.0	28
Melón ²	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sativae</i> , <i>Liriomyza</i> sp.)	0.50-1.0	7
	Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>)	0.50-1.25	
Naranja ³	Arador o negrilla de la naranja (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>) Araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>)	0.50-1.5	7
Papa ²	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza trifolii</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.)	0.50-1.0 0.30-1.0	3
	Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>)	0.50-1.25	
	Piojillo de la papa (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.50-0.75	
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.)	0.45-0.60	
Pepino ²	Minador serpentina del Chile (<i>Liriomyza munda</i>)	0.50-1.25	7
Peral ²	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.50-1.0	28
	Araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>)	0.75-1.0	
Rosal ²	Araña roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>) Araña ciclamina (<i>Steneotarsonemus pallidus</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.)	25-50 ml/10 L de agua	SL
Sandía ²	Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>)	0.50-1.25	3
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.)	0.50-1.0	

Imperial

Es un insecticida con actividad traslaminar se recomienda para el control de las plagas.



Registro: RSCO-INAC-0174-X0019-009-1.87

Titular del Registro:
AGRICULTURA NACIONAL, S.A. DE C.V.
Av. Periférico Sur 3325 Piso 3, San Jerónimo Lidice.
C.P. 10200, La Magdalena Contreras, Ciudad de México



AGROBIZ



USO AGRÍCOLA
insecticida concentrado emulsionable
Ametrina 1.8

¿Qué es?

Es un insecticida presentado como concentrado emulsionable, sirve para control de ácaros y minadores en cítricos solanáceas y ornamentales, interfiere con la transmisión neuronal y neuromuscular del insecto.

¿Para que sirve?

Control de acaros y minadores en citricos, solanáceas y ornamentales

¿Cómo funciona ?

Interfiere con la transmision neuronal y neuromuscular del insecto ocasionando la muerte

Ametrina 1.8

Insecticida, acaricida y nematicida de origen natural para cultivos extensivos e intensivos.

Controla ácaros e insectos en estadios adultos e inmaduros.

Actúa principalmente por ingestión, teniendo también actividad por contacto directo.

Inhibe rápidamente el daño producido por los insectos, quedando los mismos inmediatamente paralizados y mueren a los pocos días.

Posee movimiento traslaminar, lo que garantiza la acción protectora en ambas caras de la hoja.

Excelente acción residual, ya que se retiene en el interior de las hojas.

