




USO AGRÍCOLA
herbicida concentrado emulsionable
Ametrina +2,4-D éster isobutílico

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Ametrina: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 255 g/L de i.a./L a 20°C)	24.50%
2,4-D éster isobutílico: éster isobutílico del ácido (2,4-diclorofenoxi) acético con un contenido de ácido (2,4-diclorofenoxi)acético de 79.75 % (Equivalente a 130.5 g/L de i.a./L a 20°C)	16.40%
Ingredientes Inertes: Solvente	58.10%
TOTAL:	100.00%

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (SL)	Zacate amargo (<i>Paspalum dilatatum</i>) Fresadilla (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Correhuela (<i>Ipomoea purpurea</i>) Gordolobo (<i>Gnaphalium oxyphyllum</i>)	4.0 – 6.0	Aplicación en post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo.
	Hierba golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>) Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>)	6.0	Volumen de aplicación: 400 L/ha

Rainpax

Boro estabilizado de alta solubilidad para corregir carencias de este elemento con rapazas, ligado con nitrógeno orgánico para aumentar su biodisponibilidad.



Registro: RSCO-MEZC-HEDE-1206-X0007-009-41.9

