



USO AGRÍCOLA
herbicida suspensión acuosa
paraquat + diuron

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
PARAQUAT "USO RESTRINGIDO" : Sal dicloruro del ión 1,1'- dimetil-4,4' bipyridinio "Con un contenido del ión bipyridinio no menor de 72.4%". (Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C)	24.55%
DIURON : N'-(3,4-diclorofenil)-N,N-dimetilurea. (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C)	8.89%
INGREDIENTES INERTES : Diluyente, surfactantes, dispersante y antiespumante.	66.56%
TOTAL:	100.00%

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES
Maíz (SL)*	Verdolaga (Portulaca oleracea) Mostacilla (Sisimbrium irio) Zacate carricillo (Panicum reptans) Golondrina (Euphorbia sp.)	1.5 – 3.0	Aplicaciones dirigidas a la maleza

Triton

Es un herbicida de contacto no selectivo que mata rápidamente la maleza y no tiene efecto residual en el suelo.



Registro: RSC0-MEZC-1229-301-008-03





USO AGRÍCOLA

herbicida suspensión acuosa
paraquat + diuron

¿Qué es?

Herbicida no selectivo y de contacto en asociación con paraquat y diuron, formulado como solución acuosa

¿Para que sirve?

Control post-emergente de malezas de hojas ancha con algunos zacates en el cultivo de maíz y caña

¿Cómo funciona ?

Se absorbe por los tejidos verdes de las plantas y tiene cierta actividad en las raíces, logrando un excelente control de malezas

Paraquat+diuron

Herbicida co-formulado, no selectivo, desecante, para el control post-emergente de malezas de hoja ancha y Gramíneas. La combinación de estos 2 principios activos, provee un efecto sinérgico, pues modifica la velocidad de fotosíntesis, retrasando la destrucción celular y proporcionando una mejor distribución de Paraquat dentro de la planta, asegurando la muerte total de la misma. Recomendado para Barbechos Químicos de otoño y primavera, para el control de: Commelina sp, Parietaria sp, Viola sp, Lamium sp, y Conyza sp, con la estrategia de "Doble Golpe".

