



USO AGRÍCOLA

herbicida / concentrado soluble
Glufosinato de amonio

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Glufosinato de amonio: Ácido de amonio (2RS)- 2-amino-4-(metilfosfinato)butírico (Equivalente a 200 g de ingrediente activo / L a 20°C)	18.40%
INGREDIENTES INERTES Humectante, Agente Neutralizante y solvente.	81.60%
TOTAL:	100.00%

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES
Maíz	Coquillo (Cyperus rotundus) Lechosa (Euphorbia heterophylla) Flor amarilla (Baltimora recta)	1.125- 1.5	Realizar una aplicación foliar en post-emergencia dirigida a la maleza, cuando ésta se encuentre en crecimiento activo no mayor a 15 cm de altura, volumen de aplicación 150-250 L/Ha (SL)
Sorgo	Tomatillo (Physalis angulata) Zacate de agua (Echinochloa colonum)		

Zeus

Es un herbicida post-emergente de contacto, no selectivo y no residual, efectivo en el control de zacates y malezas de hoja ancha anuales y vivaces presentando excelente eficacia en el control de malezas difíciles



Registro: RSC0-HEDE-0231-X0107-375-18.40





USO AGRÍCOLA

herbicida / concentrado soluble
Glufosinato de amonio

¿Qué es?

Herbicida post-emergente no selectivo, primariamente de contacto, con acción sistémica parcial presentado como concentrado emulsionable

¿Para que sirve?

Control de hojas anchas y zacates en maíz y sorgo

¿Cómo funciona ?

Actúa neutralizando la síntesis de glutamina, incrementando la concentración de amoníaco en las células y al mismo tiempo inhibiendo la fotosíntesis

Glufosinato de amonio

Herbicida no selectivo, desecante, para el control de malezas en barbecho, en pre-siembra de Soja y sobre los cultivos registrados como desecante.

Rápido quemado y excelente nivel de control.

Controla gramíneas y malezas de hoja ancha difíciles como ser: Conyza sp, Echinochloa colona, Borreria, Gomphrena, entre otras. Ideal para el control de malezas resistentes a Glifosato y a herbicidas de las familias ALS y ACCASA.

No posee período de carencia para la siembra de ciertos cultivos como ser Soja, Sorgo y Girasol, lo que permite sembrar al día siguiente de ser aplicado.

En contacto con el suelo, se descompone rápidamente.

Un modo de acción diferente, ideal para incluir en la rotación de herbicidas.

No presenta volatilidad.

Posee un mejor perfil toxicológico que otros herbicidas desecantes.

