

WOLF

USO AGRÍCOLA

Insecticida / Concentrado Emulsionable
clorpirifos etil

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Clorpirifos etil: O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato (Equivalente a 475 g de i.a./L a 20°C).	44.50 %
INGREDIENTES INERTES: Emulsificantes y solvente	55.50 %
TOTAL:	100.00%

Wolf

Es un insecticida formulado como concentrado emulsionable que actúa por contacto, ingestión e inhalación, utilizado para el control de plagas.



Registro: RSC0-INAC-0115-X0413-009-44.50



AGROBIZ



USO AGRÍCOLA

Insectida / Concentrado Emulsionable clorpirifos etil

Cultivo	Plaga	Dosis Kg/ha	Observaciones
Caña de azúcar (60)*	Salivazo (<i>Aeneolamia postica</i>)	0.75 a 1.5	Realizar dos aplicaciones desde la base de la planta hasta el follaje a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.
Alfalfa (28)*	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Larva de picudo egipcio de la alfalfa (<i>Hypera brunneipennis</i>)	0.75 a 1.0 0.5 a 1.0	Realizar dos aplicaciones desde la base de la planta hasta el follaje a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.
Algodonero (21)*	Gusano de la yema del tabaco (<i>Heliothis virescens</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Perforador de la hoja del algodónero (<i>Bucculatrix thurberiella</i>) Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>) Chinche ligus (<i>Lygus sp</i>) Gusano trozador (<i>Peridroma sp</i>), (<i>Agrotis sp</i>), (<i>Euxoa auxiliaris</i>)	1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.0 a 1.5 1.5-1.75	Aplicación al follaje.
Arroz (21)*	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0.75 a 1.25	Aplicación al follaje.
Lima, Limonero, Mandarinero, Naranja, Toronjo (34)*	Arador o negrilla de la naranja (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	100 mL/100 L de agua	Aplicación al follaje.
Chile (7)*	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera ornithogalli</i>)	1.0 a 1.5	Aplicación al follaje.

Chile (7)*	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera ornithogalli</i>)	1.0 a 1.5	Aplicación al follaje.
Frijol ejotero (20)*	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	1.0 a 1.75	Aplicación al follaje.
Garbanzo (20)*	Gusano de la yema del tabaco (<i>Heliothis virescens</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	1.0 a 1.5	Aplicación al follaje.
Jitomate (1)*	Gusano soldado (<i>Spodoptera ornithogalli</i>) Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>)	1.0 a 1.5 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0	Aplicación al follaje.
Maíz (21)*	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Gusano soldado (<i>Mythimna unipuncta</i>)	0.5 a 0.75 0.75 a 1.5	Aplicación al follaje.
Manzano (30)*	Pulgón lanígero del manzano (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	1 a 2 mL /1 L de agua	Aplicación al follaje.
Pepino (7)*	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	1.5 a 2.0	Aplicación al follaje.
Sorgo (21)*	Mosquita midge (<i>Contarinia sorghicola</i>) Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>)	0.5 0.75 a 1.0 1.0 a 1.5	Aplicación al follaje.
Soya (21)*	Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	1.25 a 1.5 1.0 a 1.5	Aplicación al follaje.
Trigo (28)*	Gusano soldado (<i>Mythimna unipuncta</i>)	0.75 a 1.0	Aplicación al follaje.

